

»

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	DDD i jed. mj. (s PDV-om)	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/R/S	Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik	Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om)	Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje	Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om)	Doplata za jed. oblik	Doplata za jed. oblik (s PDV-om)	Doplata za orig. pakiranje	Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
B01AF01 163		rivaroksaban	10 mg	11,21	11,77	O	Bayer	Xarelto	film obl. tbl. 28x15 mg	16,82	17,66	470,96	494,51	RS <sup>pm0</sup>	8,41	8,83	235,48	247,25	8,41	8,83	235,48	247,25
B01AF01 164		rivaroksaban	10 mg	11,21	11,77	O	Bayer	Xarelto	film obl. tbl. 42x15 mg	16,82	17,66	706,44	741,76	RS <sup>pm0</sup>	8,41	8,83	353,22	370,88	8,41	8,83	353,22	370,88
B01AF01 165		rivaroksaban	10 mg	8,41	8,83	O	Bayer	Xarelto	film obl. tbl. 28x20 mg	16,82	17,66	470,96	494,51	RS <sup>pm0</sup>	8,41	8,83	235,48	247,25	8,41	8,83	235,48	247,25
C02AC05 161		moksonidin	0,3 mg	2,30	2,42	O	Abbott	Physio-tens	tbl. film obl. 28x0,2 mg	1,54	1,61	42,99	45,14	R <sup>pm0</sup>	0,96	1,01	26,99	28,34	0,57	0,60	16,00	16,80
C02AC05 162		moksonidin	0,3 mg	1,82	1,91	O	Abbott	Physio-tens	tbl. film obl. 28x0,4 mg	2,43	2,55	67,93	71,33	R <sup>pm0</sup>	1,73	1,82	48,54	50,97	0,69	0,73	19,39	20,36
C02CA06 161		urapidil	0,12 g	4,40	4,62	O	Takeda	Ebrantil retard	caps. 50x30 mg	1,10	1,16	55,00	57,75	R	0,62	0,65	31,00	32,55	0,48	0,50	24,00	25,20
C02CA06 162		urapidil	0,12 g	3,22	3,38	O	Takeda	Ebrantil retard	caps. 50x60 mg	1,61	1,69	80,41	84,43	R	1,24	1,30	62,00	65,10	0,37	0,39	18,41	19,33
C02CA06 163		urapidil	0,12 g	2,75	2,89	O	Takeda	Ebrantil retard	caps. 50x90 mg	2,06	2,17	103,20	108,36	R	1,86	1,95	93,00	97,65	0,20	0,21	10,20	10,71
C09AA04 172		perindopril	4 mg	1,78	1,87	O	LLS, SII, Anpharm	Prexanil A	tbl. 30x5 mg	2,22	2,34	66,74	70,08	R	0,60	0,63	18,04	18,94	1,62	1,70	48,70	51,14
C09AA04 173		perindopril	4 mg	1,19	1,24	O	LLS, SII, Anpharm	Prexanil A	tbl. 30x10 mg	2,96	3,11	88,88	93,32	R	1,20	1,26	36,08	37,88	1,76	1,85	52,80	55,44
C09BA04 174		perindopril + indapamid		0,00	0,00	O	Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd.	Prexanil Combi A	tbl. film obl. 30x(10 mg + 2,5 mg)	2,79	2,93	83,77	87,96	R	2,13	2,23	63,77	66,96	0,67	0,70	20,00	21,00
C09BB04 161		perindopril + amlodipin		0,00	0,00	O	LLS, SII, Anpharm	Norprexanil	tbl. 30x(5 mg + 5 mg)	2,03	2,13	60,78	63,82	R	1,33	1,40	39,94	41,94	0,69	0,73	20,84	21,88
C09BB04 162		perindopril + amlodipin		0,00	0,00	O	LLS, SII, Anpharm	Norprexanil	tbl. 30x(5 mg + 10 mg)	2,00	2,10	59,94	62,94	R	1,33	1,40	39,94	41,94	0,67	0,70	20,00	21,00
C09BB04 164		perindopril + amlodipin		0,00	0,00	O	LLS, SII, Anpharm	Norprexanil	tbl. 30x(10 mg + 10 mg)	3,33	3,50	99,88	104,87	R	2,66	2,80	79,88	83,87	0,67	0,70	20,00	21,00
C10AB05 162		fenofibrat	200 mg	2,11	2,21	O	Recipharm	Tricor	tbl. film obl. 30x215 mg	2,27	2,38	67,97	71,37	R <sup>pm0</sup>	1,77	1,85	52,97	55,62	0,50	0,53	15,00	15,75
J01CA04 121		amoksisicilin	1 g	1,37	1,44	O	Sandoz-Lek	Ospamox bid	tbl. za oral. susp. 16x1 g	1,37	1,44	21,91	23,01	R <sup>pm0</sup>	1,30	1,36	20,74	21,78	0,07	0,08	1,17	1,23
J01XX01 161		fosfomicin	3 g	47,39	49,76	O	Sandoz - S.P.L.	Urinex	gran. za oral. otop., vrec. 1x3 g (u 8 g granula)	47,39	49,76	47,39	49,76	R	27,76	29,15	27,76	29,15	19,63	20,61	19,63	20,61
M05BX04 061		denosumab	0,33 mg	8,94	9,39	P	Amgen Europe B.V.	Prolia	otop. za inj., štrc. napunj. 1x60 mg	1.624,95	1.706,20	1.624,95	1.706,20	RS <sup>pm0</sup>	374,22	392,93	374,22	392,93	1.250,73	1.313,27	1.250,73	1.313,27
N02AB03 961		fentanil	1,2 mg	7,44	7,81	TD	Janssen	Durogesic	flaster transd. 5x4,2 mg (25 µg/h)	11,16	11,72	55,80	58,59	R	8,37	8,79	41,85	43,94	2,79	2,93	13,95	14,65
N02AB03 962		fentanil	1,2 mg	7,44	7,81	TD	Janssen	Durogesic	flaster transd. 5x8,4 mg (50 µg/h)	22,32	23,44	111,60	117,18	R	16,74	17,58	83,70	87,89	5,58	5,86	27,90	29,30
N02AB03 963		fentanil	1,2 mg	7,44	7,81	TD	Janssen	Durogesic	flaster transd. 5x16,8 mg (100 µg/h)	44,64	46,87	223,20	234,36	R	40,18	42,18	200,88	210,92	4,46	4,69	22,32	23,44
N02AB03 971		fentanil	1,2 mg	16,61	17,44	TD	Takeda	Matrifen	flaster transd. 5x1,38 mg (12 µg/h)	11,96	12,56	59,81	62,80	R	5,36	5,62	26,78	28,12	6,61	6,94	33,03	34,68
N02AB03 972		fentanil	1,2 mg	9,87	10,36	TD	Takeda	Matrifen	flaster transd. 5x2,75 mg (25 µg/h)	14,80	15,54	74,00	77,70	R	11,16	11,72	55,80	58,59	3,64	3,82	18,20	19,11
N02AB03 973		fentanil	1,2 mg	9,87	10,36	TD	Takeda	Matrifen	flaster transd. 5x5,50 mg (50 µg/h)	29,60	31,08	148,00	155,40	R	22,32	23,44	111,60	117,18	7,28	7,64	36,40	38,22
N02AB03 974		fentanil	1,2 mg	11,00	11,55	TD	Takeda	Matrifen	flaster transd. 5x8,25 mg (75 µg/h)	49,48	51,96	247,41	259,78	R	33,48	35,15	167,40	175,77	16,00	16,80	80,01	84,01
N02AB03 975		fentanil	1,2 mg	8,27	8,68	TD	Takeda	Matrifen	flaster transd. 5x11 mg (100 µg/h)	49,60	52,08	248,00	260,40	R	44,64	46,87	223,20	234,36	4,96	5,21	24,80	26,04

«.

## Legenda smjernica:

**pm03:** U bolesnika nakon osteoporotične frakture i za liječenje osteoporoze (DXA T vrijednosti u L1-4 <= - 2,5 ili <= od -2,5 u Total/Neck), po preporuci specijalista internista, fizijatra, ortopeda ili ginekologa.

**pb06:** Prevencija moždanog udara i sistemske embolije u odraslih osoba s nevalvularnom atrijskom fibrilacijom s jednim ili više sljedećih čimbenika rizika: 1. prethodni moždani udar, tranzitorna ishemična ataka ili sistemska embolija; 2. ejskijska frakcija lijevog ventrikula < 40%; 3. simptomatsko zatajenje srca, stupanj  $\geq 2$  prema klasifikaciji NYHA; 4. dob  $\geq 75$  godina; 5. dob  $\geq 65$  godina povezana s jednim od sljedećeg: dijabetes melitus, koronarna bolest srca ili hipertenzija, a koji ne postižu s varfarinom ciljnu vrijednost INR-a (INR 2-3).

**pc03:** Za bolesnike s hipertenzijom u kojih, uz primjenu bar jedne glavne skupine antihipertenziva nije postignuta odgovarajuća kontrola arterijskog tlaka.

**pc06:** Propisuje se samo ako, nakon tri mjeseca dijete, trigliceridi u krvi nisu manji od 2 mmol/L.

**pj06:** Infekcije dišnog sustava (akutni i recidivirajući bronhitis, bronhopneumonija), sinusitis, otitis i urinarne infekcije te infekcije želuca i dvanaesnika s *Helicobacter pylori*.

– dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	Cijena za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/RS	Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik	Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om)	Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om)	Doplata za jed. oblik	Doplata za jed. oblik (s PDV-om)	Doplata za orig. pakiranje	Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
A07XA04 161		racekadotril		0,00	0,00	O	Abbott/Laboratoires, Sophartex/Ferrer	Hidrasec	gran. za oral. susp., vreć. 16x10 mg	3,26	3,43	52,21	54,82	R <sup>mi4</sup>	1,63	1,71	26,11	27,42	1,63	1,71	26,10	27,41
A10BX04 063		eksenatid	0,286	1,32	1,39	P	Lilly Pharma	Bydureon	praš. i otap. za susp. za inj. s prod. oslob., 4x2 mg	176,11	184,92	704,44	739,66	RS <sup>mi5</sup>	133,12	139,78	532,48	559,10	42,99	45,14	171,96	180,56
A10BX09 161		dapagliflozin	10 mg	10,28	10,79	O	Bristol-Myers Squibb S.r.l.	Forxiga	tbl. film obl. 28x10 mg	10,28	10,79	287,86	302,25	R <sup>mi6</sup>	5,80	6,09	162,28	170,39	4,49	4,71	125,58	131,86
C09CA06 141		kandesartan	8 mg	1,62	1,70	O	PharmaS d.o.o.	Kandesartan PharmaS	tbl. 28x8 mg	1,62	1,70	45,40	47,67	R <sup>mi4</sup>	0,51	0,54	14,37	15,09	1,11	1,16	31,03	32,58
C09CA06 142		kandesartan	8 mg	0,96	1,01	O	PharmaS d.o.o.	Kandesartan PharmaS	tbl. 28x16 mg	1,92	2,02	53,83	56,52	R <sup>mi4</sup>	1,27	1,33	35,50	37,28	0,65	0,69	18,33	19,25
C09DA06 141		kandesartan + hidroklorotiazid		0,00	0,00	O	PharmaS d.o.o.	Kandesartan + Hidroklorotiazid PharmaS	tbl. 28x(16 mg + 12,5 mg)	2,28	2,39	63,85	67,04	R <sup>mi4</sup>	1,49	1,57	41,82	43,91	0,79	0,83	22,03	23,13
G03AA10 101		gestoden + etinilestradiol		0,00	0,00	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Naelia	tbl. film obl. 24x (0,06 mg + 0,015 mg) + 4xplacebo	1,09	1,14	26,12	27,43	R	0,27	0,28	6,45	6,77	0,82	0,86	19,67	20,65
J01MA14 121		moksifloksacin	0,4 g	15,01	15,76	O	JGL d.d.	Moksacin	tbl. film obl. 5x400 mg	15,01	15,76	75,05	78,80	RS <sup>mi5</sup>	7,69	8,07	38,43	40,35	7,32	7,69	36,62	38,45
J01MA14 122		moksifloksacin	0,4 g	14,61	15,34	O	JGL d.d.	Moksacin	tbl. film obl. 7x400 mg	14,61	15,34	102,26	107,37	RS <sup>mi5</sup>	7,69	8,07	53,80	56,49	6,92	7,27	48,46	50,88
M01AE17 162		deksketoprofen	75 mg	5,37	5,64	O	Laboratorios Menarini S.A., A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l.	Dexomen	tbl. film obl. 20x25 mg	1,79	1,88	35,82	37,61	R	0,52	0,55	5,20	5,46	3,06	3,22	30,62	32,15
M01AE17 362		deksketoprofen	75 mg	5,37	5,64	O	Laboratorios Menarini S.A.	Dexomen	gran. za oral. otap., vreć. 20x25 mg	1,79	1,88	35,82	37,61	R	0,26	0,27	5,20	5,46	1,53	1,61	30,62	32,15
N07CA01 162		betahistin	24 mg	1,61	1,69	O	Abbott Healthcare SAS	Betaserc	tbl. 20x24 mg	1,61	1,69	32,13	33,74	RS <sup>mi7</sup>	0,40	0,42	8,03	8,43	1,21	1,27	24,10	25,31
N07CA01 163		betahistin	24 mg	1,61	1,69	O	Abbott Healthcare SAS	Betaserc	tbl. 50x24 mg	1,61	1,69	80,33	84,35	RS <sup>mi7</sup>	0,40	0,42	20,08	21,08	1,21	1,27	60,25	63,26
N07CA01 164		betahistin	24 mg	1,61	1,69	O	Abbott Healthcare SAS	Betaserc	tbl. 60x16 mg	1,07	1,12	64,26	67,47	RS <sup>mi7</sup>	0,27	0,28	16,07	16,87	0,80	0,84	48,19	50,60
R03AK10 361		flutikazonfluorot + vilanterol		0,00	0,00	I	Glaxo Operations UK Ltd.	Relvar Ellipta	prašak inhalata 30x(92 + 22 mcg)/doza	9,99	10,49	299,64	314,62	R <sup>mi5</sup>	8,17	8,58	245,16	257,42	1,82	1,91	54,48	57,20

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	Cijena za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/R/S	Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik	Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om)	Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje	Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om)	Doplata za jed. oblik	Doplata za jed. oblik (s PDV-om)	Doplata za orig. pakiranje	Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
R03BB05 361		aklidinij (aklidinijev bromid)	0,644 mg	7,03	7,39	I	Industrias Farmaceuticas Almirall, S.L.	Bretaris Genuair	prašak inhalata, 60x322 mcg	3,52	3,69	211,00	221,55	R <sup>003</sup>	2,55	2,68	153,09	160,74	0,97	1,01	57,91	60,81
V20AA01 915	RZ	sterilna gaza		0,00	0,00	L	Lohmann & Rauscher	Verbandmull	1x1/4 m	2,35	2,47	2,35	2,47	RS <sup>201</sup>	1,75	1,84	1,75	1,84	0,60	0,63	0,60	0,63
V20AA01 925	RZ	sterilna gaza		0,00	0,00	L	Lohmann & Rauscher	Verbandmull	1 x 1/2 m	2,85	2,99	2,85	2,99	RS <sup>201</sup>	2,55	2,68	2,55	2,68	0,30	0,32	0,30	0,32
V20AB02 936	RZ	komprese		0,00	0,00	L	Lola Ribar	Lola care Loli gauze komprese sterilne 7,5 cm x 7,5 cm, 8 sl. a2	1 vr. x (7,5 x 7,5) cm, 2 kom., 8 sl.	0,95	1,00	0,95	1,00	RS <sup>201</sup>	0,82	0,86	0,82	0,86	0,13	0,14	0,13	0,14
V20AB02 944	RZ	komprese		0,00	0,00	L	Paul Hartmann AG	Sterilux ES	1 vr. x (10 x 10) cm, 2 kom., 8 sl.	1,00	1,05	1,00	1,05	RS <sup>201</sup>	0,97	1,02	0,97	1,02	0,03	0,03	0,03	0,03
V20AB02 947	RZ	komprese		0,00	0,00	L	Tosama	Kompresa sterilna 10x10 Vivakomp Tosama	1 vr. x (10 x 10) cm, 2 kom., 8 sl.	1,00	1,05	1,00	1,05	RS <sup>201</sup>	0,97	1,02	0,97	1,02	0,03	0,03	0,03	0,03
V20AC03 926	RZ	zavoj kaliko utkani		0,00	0,00	L	Lola Ribar	Lola care kaliko zavoj 8 cm x 5 m	1 x (8 cm x 5 m)	1,72	1,81	1,72	1,81	RS <sup>201</sup>	1,58	1,66	1,58	1,66	0,14	0,15	0,14	0,15
V20AC03 936	RZ	zavoj elastični		0,00	0,00	L	Lola Ribar	Lola care lolalast 8 cm x 4 m	1 x (8 cm x 4 m)	1,72	1,81	1,72	1,81	RS <sup>201</sup>	1,58	1,66	1,58	1,66	0,14	0,15	0,14	0,15
V20AD04 914	RZ	mikropore		0,00	0,00	L	Paul Hartmann AG	Omnipor	1x (1,25 cm x 9,2 m)	3,30	3,47	3,30	3,47	RS <sup>201</sup>	2,00	2,10	2,00	2,10	1,30	1,37	1,30	1,37
V20AE05 915	RZ	stanićevina		0,00	0,00	L	Lohmann & Rauscher	Zellstoff	1 x 1 kg	22,40	23,52	22,40	23,52	RS <sup>201</sup>	18,00	18,90	18,00	18,90	4,40	4,62	4,40	4,62
V20AE05 914	RZ	stanićevina		0,00	0,00	L	Paul Hartmann AG	Pehazell	1 x 1 kg	45,00	47,25	45,00	47,25	RS <sup>201</sup>	18,00	18,90	18,00	18,90	27,00	28,35	27,00	28,35

«

## Legenda smjernica:

**pj05:** Druga linija liječenja infekcija respiratornog sustava, po preporuci specijalista.

**pr03:** Za bolesnike s umjerenom, teškom i vrlo teškom KOPB.

**pc04:** Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.

**pa14:** Dopunsko, simptomatsko liječenje akutnog proljeva u dojenčadi (starije od 3 mjeseca) i djece do 30 mjeseci starosti, zajedno s oralnom rehidracijom i uobičajenim potpornim mjerama kada te mjere same nisu dovoljne za nadzor kliničkog stanja.

**pa16:** Za liječenje šećerne bolesti tipa 2, samo za bolesnike sa BMI  $\geq 27$ , u dobi od 18 do 75 godina s klirensom kreatinina (CrCl) $>60$  ml/min ili procijenjenom brzinom glomerularne filtracije (eGFR) $>60$  ml/min/1,73 m<sup>2</sup>, za poboljšanje glikemijske kontrole kao dopuna dijeti i tjelovježbi: 1. Dodatna terapija standardnim antidijabeticima kod bolesnika s nereguliranom glikemijom kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola. 2. Dodatna terapija inzulinu (s lijekom metformin ili bez njega) za bolesnike kod kojih se uz stabilnu dozu inzulina ne postiže odgovarajuća kontrola glikemije.

**pn17:** Samo za liječenje Menierovog sindroma, po preporuci specijalista neurologa ili otorinolaringologa, najviše do 3 mjeseca.

**pa15:** Samo za pretila bolesnike (s Indeksom tjelesne mase  $> 35$ ) s tipom 2 šećerne bolesti, s nereguliranom glikemijom nakon primjene dva oralna anti-dijabetika, po preporuci specijalista dijabetologa.

**pr05:** Za liječenje bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB) s FEV1 $<60\%$  i učestalim egzacerbacijama bolesti unatoč terapiji bronhodilatatorima.

**RZ01:** U slučaju kućnog liječenja i zdravstvene njege u kući osigurane osobe, doktor primarne zdravstvene zaštite može na jedan recept propisati zavojni materijal najviše za potrebe liječenja do 7 dana.«

– brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	Cijena za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/RS	Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik	Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om)	Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje	Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om)	Doplata za jed. oblik	Doplata za jed. oblik (s PDV-om)	Doplata za orig. pakiranje	Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
A02BA02 119		ranitidin	0,3 g	2,55	2,67	0	Farmal d.d.	Rantin	tbl. film obl. 30x300 mg	2,55	2,67	76,41	80,23	R	2,36	2,48	70,86	74,40	0,19	0,19	5,55	5,83
A02BC01 141		omeprazol	20 mg	2,72	2,85	0	Farmal d.d.	Omezol	caps. 14x20 mg	2,72	2,85	38,04	39,94	Rpa11	1,50	1,58	21,04	22,09	1,21	1,28	17,00	17,85
A02BC01 142		omeprazol	20 mg	1,86	1,95	0	Farmal d.d.	Omezol	caps. 28x20 mg	1,86	1,95	52,07	54,67	Rpa11	1,50	1,58	42,07	44,17	0,36	0,38	10,00	10,50
A02BC05 141		esomeprazol	30 mg	2,45	2,57	0	Farmal d.d.	Esomeprazol Farmal	tbl. žel. otp. 14x20 mg	1,63	1,71	22,85	23,99	Rpa11	1,50	1,58	21,04	22,09	0,13	0,14	1,81	1,90
A02BC05 142		esomeprazol	30 mg	2,45	2,57	0	Farmal d.d.	Esomeprazol Farmal	tbl. žel. otp. 28x20 mg	1,63	1,71	45,72	48,01	Rpa11	1,50	1,58	42,07	44,17	0,13	0,14	3,65	3,83
A10BA02 181		metformin	2 g	0,88	0,92	0	Berlin-Chemie AG	Siofor 500	tbl. film obl. 120x500 mg	0,22	0,23	26,26	27,57	R	0,19	0,20	22,36	23,48	0,03	0,03	3,90	4,10
A10BB12 139		glimepirid	2 mg	1,10	1,16	0	Farmal d.d.	Glirid	tbl. 30x1 mg	0,55	0,58	16,52	17,35	R	0,42	0,45	12,72	13,36	0,13	0,13	3,80	3,99
A10BB12 140		glimepirid	2 mg	0,99	1,04	0	Farmal d.d.	Glirid	tbl. 60x1 mg	0,50	0,52	29,74	31,23	R	0,43	0,46	26,05	27,35	0,06	0,06	3,69	3,87
A10BD07 161		sitagliptin + metformin		0,00	0,00	0	Frosst Iberica	Janumet	tbl. film obl. 56x(50 mg + 850 mg)	5,30	5,57	296,80	311,64	Rpa06	3,98	4,17	222,60	233,73	1,33	1,39	74,20	77,91
C08CA01 171		amlodipin	5 mg	1,01	1,06	0	Heinrich Mack	Norvasc	tbl. 30x5 mg	1,01	1,06	30,30	31,82	R	0,91	0,95	27,27	28,63	0,10	0,11	3,03	3,18
C08CA01 172		amlodipin	5 mg	0,51	0,54	0	Heinrich Mack	Norvasc	tbl. 30x10 mg	1,03	1,08	30,88	32,42	R	0,93	0,97	27,80	29,19	0,10	0,11	3,08	3,23
C08DA01 104		verapamil	0,24 g	2,77	2,91	0	Abbott	Isoptin RR	tbl. 20x240 mg	2,77	2,91	55,43	58,20	R	2,03	2,14	40,67	42,70	0,74	0,77	14,76	15,50
C09AA04 145		perindopril	4 mg	0,78	0,82	0	Farmal d.d.	Nexazin	tbl. 30x4 mg	0,78	0,82	23,32	24,49	R	0,48	0,51	14,43	15,15	0,30	0,31	8,89	9,33
C09AA10 165		trandolapril	2 mg	0,98	1,03	0	Pharmathen S.A.	Trandoten	caps. tvrda 50x0,5 mg	0,49	0,51	24,50	25,73	R	0,12	0,13	6,01	6,31	0,37	0,39	18,49	19,41
C09AA10 166		trandolapril	2 mg	0,62	0,65	0	Pharmathen S.A.	Trandoten	caps. tvrda 28x2 mg	1,24	1,30	34,77	36,51	R	0,48	0,50	13,47	14,14	0,76	0,80	21,30	22,37
C09AA10 167		trandolapril	2 mg	0,35	0,37	0	Pharmathen S.A.	Trandoten	caps. tvrda 28x4 mg	1,40	1,47	39,21	41,17	R	0,96	1,01	26,94	28,29	0,44	0,46	12,27	12,88
C09BA04 146		perindopril + indapamid		0,00	0,00	0	Farmal d.d.	Nexazin combi	tbl. 30x(2 mg + 0,625 mg)	0,47	0,50	14,21	14,92	R	0,34	0,35	10,11	10,62	0,14	0,14	4,10	4,31
C09BA04 147		perindopril + indapamid		0,00	0,00	0	Farmal d.d.	Nexazin combi	tbl. 30x(4 mg + 1,25 mg)	0,96	1,00	28,70	30,14	R	0,67	0,71	20,21	21,22	0,28	0,30	8,49	8,91
C09XA02 161		aliskiren	0,15 g	4,62	4,85	0	Novartis Pharma Stein AG	Rasilez	tbl. film obl. 28x150 mg	4,62	4,85	129,28	135,74	RSpC04	1,08	1,14	30,28	31,79	3,54	3,71	99,00	103,95
C09XA02 162		aliskiren	0,15 g	2,31	2,42	0	Novartis Pharma Stein AG	Rasilez	tbl. film obl. 28x300 mg	4,62	4,85	129,28	135,74	RSpC04	2,16	2,27	60,56	63,59	2,45	2,58	68,72	72,16
C10AA01 117		simvastatin	30 mg	1,64	1,72	0	PharmaS d.o.o.	Simvastatin PharmaS	tbl. film obl. 20x10 mg	0,55	0,58	10,96	11,51	RpC05	0,48	0,50	9,5	9,98	0,07	0,08	1,46	1,53
C10AA01 145		simvastatin	30 mg	1,92	2,02	0	PharmaS d.o.o.	Simvastatin PharmaS	tbl. film obl. 20x20 mg	1,28	1,34	25,54	26,82	RpC05	0,95	1	19	19,95	0,33	0,34	6,54	6,87
C10AA05 171		atorvastatin	20 mg	2,17	2,28	0	Goedecke GmbH za Pfizer	Sortis	tbl. film obl. 30x10 mg	1,09	1,14	32,56	34,19	RpC05	0,71	0,75	21,38	22,45	0,37	0,39	11,18	11,74
C10AA05 172		atorvastatin	20 mg	1,92	2,01	0	Goedecke GmbH za Pfizer	Sortis	tbl. film obl. 30x20 mg	1,92	2,01	57,51	60,39	RpC05	1,43	1,50	42,76	44,90	0,49	0,52	14,75	15,49
C10AA05 174		atorvastatin	20 mg	1,83	1,92	0	Goedecke GmbH za Pfizer	Sortis	tbl. film obl. 30x80 mg	7,32	7,69	219,69	230,67	RpC05	5,70	5,99	171,02	179,57	1,62	1,70	48,67	51,10

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	Cijena za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/RS	Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik	Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om)	Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje	Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om)	Doplata za jed. oblik	Doplata za jed. oblik (s PDV-om)	Doplata za orig. pakiranje	Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
C10AA07 111		rosuvastatin	10 mg	2,15	2,26	O	Belupo	Rosix	tbl. film obl. 28x5 mg	1,07	1,12	30,03	31,53	Rpc05	0,71	0,75	19,95	20,95	0,36	0,38	10,08	10,58
C10AA07 161		rosuvastatin	10 mg	3,44	3,61	O	AstraZeneca	Crestor 10 mg	film obl.tl. 28x10 mg	3,44	3,61	96,32	101,14	Rpc05	1,43	1,50	39,90	41,90	2,02	2,12	56,42	59,24
C10AA07 162		rosuvastatin	10 mg	2,84	2,98	O	AstraZeneca	Crestor 20 mg	film obl.tl. 28x20 mg	5,68	5,96	159,04	166,99	Rpc05	2,85	2,99	79,81	83,80	2,83	2,97	79,23	83,19
C10AA07 172		rosuvastatin	10 mg	1,58	1,66	O	Adamed	Rosuvex	tbl. film obl. 28x10 mg	1,58	1,66	44,24	46,45	Rpc05	1,43	1,50	39,90	41,90	0,16	0,16	4,34	4,56
C10BX03 161		amlodipin + atorvastatin		0,00	0,00	O	Pfizer	Caduet	tbl. film obl. 30x(5 mg + 10 mg)	2,17	2,28	65,12	68,38	Rpc05	1,43	1,50	42,76	44,90	0,75	0,78	22,36	23,48
C10BX03 162		amlodipin + atorvastatin		0,00	0,00	O	Pfizer	Caduet	tbl. film obl. 30x(10 mg + 10 mg)	2,17	2,28	65,12	68,38	Rpc05	1,43	1,50	42,76	44,90	0,75	0,78	22,36	23,48
D01AE15 442		terbinafin		0,00	0,00	L	Farmal d.d.	Atere	krema 30 g (10 mg/g)	38,44	40,36	38,44	40,36	R	17,22	18,08	17,22	18,08	21,22	22,28	21,22	22,28
D05AX05 411		tazartan		0,00	0,00	L	Belupo	Zorac 0,05%	gel 1x15 g (0,5 mg/1 g)	44,61	46,84	44,61	46,84	Rpd02	40,15	42,16	40,15	42,16	4,46	4,68	4,46	4,68
D05AX05 412		tazartan		0,00	0,00	L	Belupo	Zorac 0,1%	gel 1X15 g (1 mg/1 g)	49,74	52,23	49,74	52,23	Rpd02	44,77	47,01	44,77	47,01	4,97	5,22	4,97	5,22
D07AC01 417		betametazon		0,00	0,00	L	Belupo	Belodermlon	boč. poli- etil. 1x20 ml (0,5 mg/1g)	14,77	15,51	14,77	15,51	R	13,28	13,94	13,28	13,94	1,49	1,56	1,49	1,56
G03CA03 961		estradiol	50 mcg	0,09	0,10	TD	Novartis Pharma	Estraderm TTS 25	flaster 6x2 mg	3,68	3,86	22,05	23,15	R	2,76	2,89	16,54	17,37	0,92	0,96	5,51	5,79
G04BD08 162		solifenacin	5 mg	4,61	4,84	O	Astellas Pharma Europe B.V.	Vesicare	tbl. film obl. 30x10 mg	9,22	9,68	276,49	290,31	Rpg06	7,68	8,06	230,40	241,92	1,54	1,61	46,09	48,39
H05BA01 764		kalcitonin	200 i.j.	0,00	0,00	N	Novartis Pharma	Miacalcic	rasprš. za nos 14x200 i.j.	344,35	361,57	344,35	361,57	Rph01	309,91	325,41	309,91	325,41	34,44	36,16	34,44	36,16
J01FA15 161		telitromicin	0,8 g	31,61	33,19	O	sanoaventis S.p.A.	Ketek	tbl. film obl. 10x400 mg	15,80	16,59	158,04	165,94	RSpj03	7,32	7,69	73,20	76,86	8,48	8,91	84,84	89,08
L02BB01 161		flutamid	0,75 g	10,48	11,00	O	Schering-Plough	Flucinome	tbl. 100x250 mg	3,49	3,67	349,34	366,81	RSpl02	3,31	3,48	331,14	347,70	0,18	0,19	18,20	19,11
L02BG04 163		letrozol	2,5 mg	11,00	11,55	O	PharmaSwiss d.o.o.	Femozol	tbl. film obl. 30x2,5 mg	11,00	11,55	330,00	346,50	RSpl03	10,05	10,55	301,38	316,45	0,95	1,00	28,62	30,05
L02BG06 161		eksemestan	25 mg	12,00	12,60	O	EirGen Pharma Ltd., Siegfried Generics Ltd., ICN Polfa Rzeszów S.A.	Exemestane Pharma-Swiss	tbl. film obl. 30x25 mg	12,00	12,60	360,00	378,00	RSpl04	10,05	10,55	301,38	316,45	1,95	2,05	58,62	61,55
L04AA13 163		leflunomid	20 mg	13,87	14,56	O	Aventis Intercontinental	Arava	tbl. film obl. 3x100 mg	69,33	72,80	207,99	218,39	RSpl01	68,61	72,04	205,84	216,13	0,72	0,75	2,15	2,26
M05BA04 115		alendronat natrij	10 mg	2,75	2,89	O	Farmal d.d.	Aldron	tbl. 4x70 mg	19,25	20,21	77,00	80,85	RSpm03	16,17	16,98	64,68	67,91	3,08	3,23	12,32	12,94
M05BA07 111		rise-dronat natrij	5mg	2,75	2,89	O	Belupo	Bonna	tbl. film obl. 28x5 mg	2,75	2,89	77,00	80,85	RSpm03	2,31	2,43	64,68	67,91	0,44	0,46	12,32	12,94
N02AB03 964		fentanil	1,2 mg	23,09	24,24	TD	Janssen	Durogesic	flaster transd. 5x2,1 mg (12 µg/h)	16,62	17,46	83,12	87,28	R	5,36	5,62	26,78	28,12	11,27	11,83	56,34	59,16
N03AX12 162		gabapentin	1,8 g	10,08	10,58	O	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, GENERA LIJEKOVNI d.o.o.	Neurontin	caps. 50x300 mg	1,68	1,76	84,00	88,20	RSpm14	1,51	1,59	75,60	79,38	0,17	0,18	8,40	8,82

Šifra ATK	Ornaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed. mj.	Cijena za DDD	Cijena za DDD (s PDV-om)	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena jed. oblika (s PDV-om)	Cijena orig. pakiranja	Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)	R/RS	Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik	Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om)	Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje	Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om)	Doplata za jed. oblik	Doplata za jed. oblik (s PDV-om)	Doplata za orig. pakiranje	Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
N03AX12 163		gabapentin	1,8 g	9,33	9,79	0	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Neurontin	caps. 50x400 mg	2,07	2,18	103,65	108,83	RSpn14	1,66	1,75	83,20	87,36	0,41	0,43	20,45	21,47
R03AK08 361		beklometazon + formoterol		0,00	0,00	I	Chiesi	Foster	inhalat stlač. 120x(100 mcg + 6mcg)	240,48	252,50	240,48	252,50	Rpr01	216,43	227,25	216,43	227,25	24,05	25,25	24,05	25,25
R06AX26 181		feksofenadin	0,12 g	1,80	1,89	O	Sanofi-Aventis GmbH-Sanofi-synthelabo Ltd, Patheon UK, Sanofi Winthrop Tours	Telfast	tbl. 10x120 mg	1,80	1,89	18,02	18,92	R	1,15	1,21	11,50	12,08	0,65	0,68	6,52	6,85
R06AX27 312		desloratadin	5 mg	3,15	3,31	O	Belupo	Alerdin	otop. oral. 120 ml (0,5 mg/ml)	37,80	39,69	37,80	39,69	R	14,97	15,72	14,97	15,72	22,83	23,97	22,83	23,97
S01CA05 761		betametazon + gentamicin		0,00	0,00	L	Scheering-Plough	Gara-sone	kapi za oči i uši 0,3%, 1x5 ml	15,72	16,51	15,72	16,51	R	10,19	10,70	10,19	10,70	5,53	5,81	5,53	5,81

### Legenda smjernica:

**pd02:** Samo za osobe starije od 18 godine života za liječenje psorijaze in placibus, koja zahvaća do 10% površine tijela.

**ph01:** Samo za bolesnike s dokazanom hiperkalcemijom i Mb. Paget.

**pj03:** 1. Samo za bolesnike starije od 18 godina s akutnom egzacerbacijom KOPB, alergičnim na penicilin te nakon neuspjeha terapije makrolidima; 2. Za bolesnike starije od 13 godina sa streptokoknom anginom, alergičnim na penicilin te nakon neuspjeha terapije makrolidima, po preporuci specijalista.

**pl01:** Za bolesnike koji ne reagiraju na metotreksat i sulfasalazin, po preporuci specijalista reumatologa.

**pm03:** U bolesnika nakon osteoporotične frakture i za liječenje osteoporoze (DXA T vrijednosti u L1-4 <= - 2,5 ili <= od -2,5 u Total/Neck), po preporuci specijalista internista, fizijatra, ortopeda ili ginekologa.

**pc04:** Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.

**pa06:** Za liječenje šećerne bolesti tipa 2, za poboljšanje glikemijske kontrole kod odraslih osoba kao dopuna dijeti i tjelovježbi: 1. Dodatna terapija standardnim antidijabeticima kod bolesnika s nereguliranom glikemijom kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola. 2. Dodatna terapija inzulinu (s lijekom metformin ili bez njega) za bolesnike kod kojih se uz stabilnu dozu inzulina ne postiže odgovarajuća kontrola glikemije.

**pc05:** 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.

**pa11:** Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju *Helicobacter pylori*, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test *Helicobacter pylori* na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.

**pg06:** Samo za bolesnike s urinarnom inkontinencijom i neurogenim mokraćnim mjehurom.

**pl02:** Po preporuci specijalista urologa ili onkologa.

**pl03:** 1. Adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopausalnih bolesnica s pozitivnim hormonskim receptorima. 2. Produženo adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopausalnih bolesnica pozitivnih hormonskih receptora nakon 5 godina adjuvantne primjene tamoksifena. 3. Metastatski rak dojke postmenopausalnih bolesnica, pozitivnih hormonskih receptora. Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji: hormonski ovisna bolest, ECOG 0-3, nepostojanje CNS presadnica. U bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje, a po završetku liječenja onkolog je dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje preporuča specijalist internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.

**pl04:** 1. Adjuvantno hormonsko liječenje postmenopausalnih bolesnica s estrogen-receptor pozitivnim ranim rakom dojke, nakon 2-3 godine početnog adjuvantnog liječenja tamoksifenom, do ukupno 5 godina adjuvantnog hormonskog liječenja; 2. Metastatski/uznapredovali rak dojke postmenopausalnih bolesnica hormonski pozitivnih receptora, nakon neuspjeha liječenja lijekom tamoksifenom. Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji: hormonski ovisna bolest, ECOG 0-3, nepostojanje CNS presadnica. U bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje, a po završetku liječenja onkolog je dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje preporuča specijalist internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.

**pm03:** Samo u bolesnika nakon osteoporotične frakture i za liječenje osteoporoze (DXA T vrijednosti u L1-4  $\leq$  - 2,5 ili  $\leq$  od -2,5 u Total/Neck), po preporuci specijalista internista, fizijatra, ortopeda ili ginekologa.

**pn14:** 1. Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra; 2. Za bipolarni afektivni poremećaj (odobreno samo za lijek lamotrigin), s refrakternim oblicima bolesti na litij-karbonat ili karbamazepin, po preporuci specijalista psihijatra.”

**pr01:** 1. Za liječenje bolesnika s astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2-agonista dugog djelovanja/bronhodilatatora; 1.a. u bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta-2-agonistima kratkog djelovanja ili 1.b. u bolesnika koji su već postigli kontrolu astme kombinacijom inhalacijskog kortikosteroida i beta-2-agonista dugog djelovanja, radi održavanja kontrole bolesti.«

» smjernica pod oznakom: »**pc02**« u Dopunskoj listi lijekova Zavoda mijenja se i glasi:

»**pc02:** 1. Za bolesnike sa stabilnom anginom pectoris nakon revaskularizacije u slučaju nepodnošljivosti ili kontraindikacije za blokatore beta-adrenergičkih receptora i srčane frekvencije više od 70 otkucaja u minuti, po preporuci specijalista internista kardiologa. 2. Za liječenje kroničnog zatajenja srca stupnja III do IV NYHA klasifikacije sa sistoličkom disfunkcijom (LVEF<35%), kod bolesnika u sinusnom ritmu sa srčanom fekvencijom  $\geq$  75 otkucaja u minuti u mirovanju u kombinaciji sa standardnom terapijom uključujući terapiju s beta-blokatorom ili kada je primjena beta-blokatora kontraindicirana ili se ne podnosi, po preporuci specijalista internista kardiologa.«